

Tableau de l'offre en soin

Problématiques de soin et/ou diagnostics infirmiers	Ressources de la personne et de l'institution, en lien avec les problématiques	Objectifs de soin	Interventions de soin et justifications des actions
<p><u>Obésité morbide BMI= 33</u></p> <p>Difficultés dans la réalisation des AVQ :</p> <p>Incapacité à effectuer seule ses soins d'hygiène</p> <p>Incapacité à s'habiller et se déshabiller seule</p> <p>Incapacité à se mobiliser dans son lit et à faire les transferts, seule</p>	<p>-Elle capable de se laver le haut du corps</p> <p>-Elle est capable de choisir ses habits selon ses goûts et les adapter à la saison</p> <p>-Garde-robe adaptée à sa morphologie et modifiée pour faciliter l'habillage</p> <p>-Participe activement lors des mobilisations</p> <p>-A disposition : la barrière du lit, la potence, l'alèse et le disque de transfert. Le personnel soignant.</p>	<p>Maintenir et stimuler son indépendance pour la réalisation de la toilette du haut du corps afin de maintenir une bonne hygiène corporelle.</p> <p>Garder son état cutané sain.</p> <p>Maintenir sa participation active lors de l'habillage et du déshabillage.</p> <p>Maintenir et favoriser une mobilisation quotidienne lors des soins d'hygiène et les transferts</p>	<p>La laisser participer un maximum à sa toilette et l'aider pour les parties non accessibles.</p> <p>Pour le confort et l'efficacité du soin, la petite toilette s'effectue au lit</p> <p>Contrôler son état cutané (les plis) et masser à l'Excipial crème les points d'appuis</p> <p>Lui fournir les habits qu'elle a choisi.</p> <p>La laisser participer un maximum à son habillage et l'aider en cas de difficultés.</p> <p>La solliciter à se mobiliser pour la toilette du dos et des parties intimes, en fonction de son état.</p> <p>Demander l'aide d'une collègue pour les transferts.</p>

Problématiques de soin et/ou diagnostics infirmiers	Ressources de la personne et de l'institution, en lien avec les problématiques	Objectifs de soin	Interventions de soin et justifications des actions
<p><u>Démence de type Alzheimer débutante</u></p> <p>Anxiété/ angoisse reliée à la désorientation temporo-spatiale se manifestant par une légère agitation ou une apathie</p>	<p>-Exprime son anxiété -Réside dans une chambre seule avec des meubles personnels sans son mari dont la porte est identifiée par sa photo -la décoration des communs de l'institution permet à Mme R de se repérer dans le temps (ex : calendrier des saisons, horloge, etc...)</p>	<p>Surveiller l'apparition de l'anxiété ou des angoisses. Observer les changements de comportement Favoriser l'expression de ses émotions</p>	<p>La rassurer et l'écouter pour la calmer, en ayant une attitude douce, ouverte, empathique et contenante.</p> <p>Rechercher d'éventuelles causes de son anxiété.</p> <p>Quotidiennement, vérifier avec Mme son orientation (jour, lieu, date, etc...).</p> <p>Lorsque Mme est en présence de son mari et qu'elle manifeste de la nervosité et de l'irritabilité, ramener Mme dans sa chambre pour qu'elle puisse se calmer.</p> <p>Proposer à Mme des activités individuelles et calmes pour diminuer sa nervosité.</p>

*Des lignes supplémentaires peuvent éventuellement être ajoutées si besoin.